

Obaviješteni pristanak za biopsiju prostate

Ime i prezime pacijenta: _____

Spol: M Ž **Datum:** _____

MBO osigurane osobe:

--	--	--	--	--	--	--

Adresa: _____ **Telefon:** _____

Mjesto rođenja: _____

Ime i prezime zakonskog zastupnika/skrbnika: _____

OPIS POSTUPKA I DOBROBITI:

Biopsija prostate je postupak koji se koristi za dijagnosticiranje karcinoma prostate. Ako ste naručeni za biopsiju prostate to znači da je Vaš urolog, u suradnji s Vama, procijenio da kod Vas postoji određeni čimbenik rizika za razvoj karcinoma (povišena vrijednost PSA, sumnjivi digitorektalni nalaz). Nakon urološkog pregleda na kojem ste naručeni za biopsiju, biti će Vam uručene upute te određen datum kada se trebate javiti u urološku ambulantu. Postupak se provodi ambulantno i traje oko 15 minuta. Za to vrijeme bolesnik leži na leđima, na za to predviđenom stolu, a ultrazvučna sonda se uvodi kroz debelo crijevo. Zahvat je malo bolan, ali više neugodan. Potrebna je **uputnica liječnika opće prakse** - Dnevna bolnica (uputnica B1), biopsija prostate. Napomena: Narednih nekoliko dana potrebno je izbjegavati sjedenje, žestoka pića i jače začinjena jela, težak fizički rad i pothlađivanje. Potrebno je uzimati dosta tekućine te konzumirati laganu hranu. Napominjemo da se može pojaviti krv u mokraći i stolici. Uputa za bolesnike na antikoagulantnoj terapiji (Marivarin, Martefarin, Pradaxa...) nalazi se u nastavku.

Standardno se pod kontrolom ultrazvuka uzima 10-12 uzoraka tkiva. Taj broj može se mijenjati prema procjeni urologa (npr kod malih prostata može se uzeti manji broj uzoraka nego kod većih ili se sa sumnjivog mjesta može uzeti više uzoraka tkiva). Na kraju posjete bolesniku se zakazuje novi termin kada će biti upoznat sa rezultatom biopsije (obično nakon 2 tjedna). Antibiotička terapija se nastavlja ukupno 5 dana od dana kada je uzet prvi antibiotik i to u dozi 2x500mg (1 tbl od 500 mg svakih 12 sati). Manji broj bolesnika osjeća bolove nakon biopsije i tada se može popiti lijek protiv bolova kao npr paracetamol (Lekadol, Lupocet, Plicet ili sl) ili ibuprofen (Neofen, Brufen ili sl). Ako ne dođe do razvoja komplikacija (vidi dalje), nakon 24 sata može se vratiti svom uobičajenom dnevnom rasporedu (povratak na posao), s napomenom da se bar još 2-3dana izbjegava teži tjelesni napor, vožnja bicikla, motora. Također, potrebno je izbjegavati sjedenje, žestoka pića i jače začinjena jela kao i pothlađivanje. Potrebno je uzimati dosta tekućine te konzumirati laganu hranu.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE / RIZICI POSTUPKA:

Najčešće komplikacije su pojava krvi u spermii (može biti u trajanju i do 1 mjesec nakon biopsije), pojava krvi u mokraći (najčešće do 2 dana nakon biopsije, rjeđe duže), pojava krvi iz rektuma (obično samo u prva 2 dana nakon biopsije). Ove pojave smatraju se uobičajenima, prolaze spontano i ne zahtijevaju ponovni dolazak u hitnu službu ili urologu.

Razlozi za javljanje na hitni prijem su: vrućica (38°C ili više), zimica, jaka bol u zdjelici ili testisima, obilnije rektalno krvarenje, retencija urina (nemogućnost mokrenja).

Posebna upozorenja: Osobe koje piju **Marivarin, Martefarin i sl lijekove** trebaju to naglasiti urologu kada ih naručuje za biopsiju. Njima se savjetuje da se obrate odabranom liječniku opće prakse, internisti ili transfuziologu kako bi prije biopsije prekinuli terapiju, te započeli zamjensku terapiju niskomolekularnim heparinom (obično 3 dana prije biopsije) uz kontrolu nalaza INR u transfuziološkoj ambulanti ujutro na dan biopsije.

Bolesnici koji piju **Aspirin, Andol, Cardiopirin** trebaju prekinuti terapiju na dan biopsije te ju nastaviti dan nakon biopsije osim u slučaju obilnijeg krvarenja.

Bolesnici koji su liječeni zbog infekcija urotrakta trebaju prije biopsije imati sterilan urin.

Upute za pripremu bolesnika za biopsiju prostate se nalaze u nastavku ovog dokumenta (3. str.)

Obaviješten/a sam da se pri izvođenju ovog medicinskog postupka mogu dogoditi poznate i druge rijetke komplikacije poznatog i nepoznatog uzroka. Obaviješten/a sam i pristajem da se uzorak koji se ovim postupkom dobije dalje analizira, šalje na analizu u druge ustanove te se može uništiti prema zakonu.

**IZJAVLJUJEM DA SLOBODNOM VOLJOM, UTEMELJENOJ NA POTPUNOJ
OBAVIJEŠTENOSTI O PREPORUČENOM DIJAGNOSTIČKOM ODносно TERAPIJSKOM
POSTUPKU
DAJEM SUGLASNOST
za prihvatanje preporučenog postupka**

Datum: _____

Potpis pacijenta/zakonskog zastupnika/skrbnika:

Potpis i faksimil liječnika:

PRIPREMA BOLESNIKA ZA BIOPSIJU PROSTATE

Dan prije pretrage:

Doručak- uobičajeni

Ručak- uobičajeni

Uzeti preporučeni antibiotik

U 14 sati popiti X- Prep sirup (za stolicu)

Piti puno tekućine

Ne večerati

Na dan pretrage:

Lagani doručak

Ujutro- popiti antibiotik

Uzeti uobičajene lijekove (za tlak, šećer, srce...)

Donijeti:

Uputnicu za bolničko liječenje

Svu medicinsku dokumentaciju

Stvari za bolnicu (pidžama, papuče, pribor za osobnu higijenu)

Uzeti tekućinu 1-2 l (sok, voda)

Doći u 7:30 sati s pratnjom