

UPUTE ZA BOLESNIKE NAKON OPERACIJE KRAJNIKA

Što jesti nakon operacije krajnika?

- Mekanu, kašastu hranu i tekućinu
- Variva, mljeveno meso, kuhanu i pasirano povrće
- Od voća preporučamo banane
- Guste voćne sokove od marelice ili breskve, ledeni čaj u većim količinama

Što izbjegavati nakon operacije krajnika?

- Žvakaće gume, bombone, slane štapiće, čips, orašaste plodove...
- Kisele sokove, a nikako konzumirati gazirane
- Kiselo voće, sladoled
- Vruću, krutu i začinjenu hranu i teku

Što uzimati za smanjenje postoperativne боли?

Postoperativno se javlja bol kod gutanja sline, tekućine ili hrane. Preporučamo redovito uzimati analgetike, prema savjetu liječnika, a ne uzimanje u trenucima kada se javi jaka bol. Djeci do 16 godina davati preparate u obliku sirupa ili čepića kao što su Ibuprofen, Neofen svakih osam sati te u kombinaciji sa Lupocet, Plicet sirupom. Doza ovisi o tjelesnoj težini i uzrastu djeteta, a najbolje pola sata prije obroka.

Odraslima također preporučamo paracetamol 1g svakih osam sati u kombinaciji sa drugim analgeticima koje su uzimali i prije zahvata (nikako ne uzimati Andol, Acisal ili Aspirin zbog mogućnosti krvarenja). Nakon operacije krajnika većinu bolesnika bole uši. Obično se radi o prenesenoj боли koja ne treba zabrinjavati, jer je uzrokovana samom operacijom i postupno prestaje oporavkom bolesnika. Operativna rana zaraštava fibrinskim naslagama koje imaju specifičan miris i bjelkaste su boje. Većina bolesnika ima temperaturu do 38 C i ona nije pokazatelj upale.

Kako se ponašati nakon operacije?

Preporuča se mirovanje i tuširanje u mlakoj vodi, uz izbjegavanje fizičkih aktivnosti i pranja kose do prve kontrole. Kontrolni pregled je sedmi postoperativni dan (potrebna je uputnica za kontrolni pregled A2). Kod pacijenata sa ugrađenim ventilacijskim cjevčicama obavezno štititi uho od vode (fizička zaštita zvukovoda npr. čepići za uši). Ukoliko se primijeti svježe krvi u slini ili temperatura iznad 38 C koja se uz uobičajene postupke za snižavanje temperature ne smiruje odmah se javiti na ORL odjel ili nadležnom liječniku.

Voditelj Odjela za ORL: